

свойствах. Сильно расширяет периферические сосуды и вызывает снижение артериального давления.

Применяют для лечения заболеваний, связанных с нарушением периферического кровообращения (энтерит, болезнь Рейно, акроцианоз и др.). Уменьшая или полностью снимая спазмы сосудов, препарат способствует усилению кровообращения, облегчению боли и улучшению функционального состояния конечностей (улучшение ходьбы). Свойство тропafenа стимулировать периферическое кровообращение дает основание применять его при лечении трофических язв конечностей и вяло заживающих ран.

Препарат назначают и для купирования гипертонических кризов, а также для предупреждения гипертонических реакций, обусловленных повышением содержания в крови катехоламинов во время наркоза и хирургических вмешательств.

Тропафен является ценным средством для диагностики и лечения катехоламинпродуцирующих опухолей надпочечников (феохромцитомы, феохромобластомы).

Вводят под кожу, внутримышечно и внутривенно.

При энтерите и других заболеваниях, сопровождающихся нарушением периферического кровообращения,

вводят подкожно или внутримышечно по 0,5—2 мл 1% или 2% раствора 1—3 раза в день. Курс лечения 10—20 дней и более. При необходимости курсы повторяют.

Для купирования и предупреждения гипертонических кризов вводят подкожно или внутримышечно 0,5—1 мл 1% или 2% раствора.

Тропафен обычно хорошо переносится. Следует, однако, учитывать возможность развития ортостатического коллапса, поэтому во время инъекции препарата и в течение 1½—2 ч после нее больные должны находиться в положении лежа. При применении тропafenа, так же как и иных неизбирательных α -адреноблокаторов (см. Фентоламин), иногда развивается тахикардия.


Подобно другим α -адреноблокаторам, препарат противопоказан при резких органических изменениях сердца и сосудов.

ФОРМА ВЫПУСКА: лиофилизированный порошок в ампулах по 0,02 г (20 мг). Содержимое ампулы растворяют перед употреблением в стерильной воде для инъекций. Для приготовления 1% раствора вводят в ампулу 2 мл воды, для приготовления 2% раствора — 1 мл.

ХРАНЕНИЕ: список Б.

3. ПИРРОКСАН (Pyrroxanum).

6-[4-(3-Фенилпирролидинил-1)пропионил]-бензо-1,4-диоксана гидрохлорид:



СИНОНИМ: Пророксан, Прогохан.

Белый или белый со слегка желтоватым оттенком кристаллический порошок. Трудно растворим в воде и спирте.

Препарат оказывает периферическое и центральное α -адреноблокирующее действие. Обладает противозудными свойствами.

Применяют для лечения и профилактики различных заболеваний, в основе которых лежит патологическое повышение симпатического тонуса, в том числе при дизцефальных и гипертонических кризах и других проявлениях дизцефальной патологии симпатико-адреналового типа. При гиперсимпатикотонии препарат ослабляет психическое напряжение, тревогу.

Используют как профилактическое средство при перевозбуждении вестибулярного аппарата (при морской и воздушной болезни и синдроме Меньера); эффект, однако, более выражен при сочетании с холинолитиками и противогистаминными препаратами.

Назначают также для ослабления явлений морфинной и алкогольной абстиненции.

Вводят внутрь, под кожу и внутримышечно.

Для купирования дизцефальных и гипертонических кризов вводят под кожу или внутримышечно 0,02—0,03 г (2—3 мл 1% раствора), а для их профилактики назначают по 0,015—0,03 г (1—2 таблетки) внутрь 2—3 раза в день.

При бессоннице, в особенности связанной с зудящим дерматозом, рекомендуется принимать по 1—2 таблетки перед сном, для профилактики воздушной болезни — за 30—40 мин до полета.

При морфинной абстиненции вводят 0,03 г (3 мл 1% раствора) под кожу или внутримышечно или дают внутрь по 0,045 г (3 таблетки) 3 раза в день в течение 5 дней.

При алкогольной абстиненции вводят по 3 мл 1% раствора 3 раза в день.

Максимальные дозы для взрослых: внутрь — разовая 0,06 г (60 мг), суточная 0,18 г (180 мг); парентерально — разовая 0,045 г (45 мг), суточная 0,09 г (90 мг).

Детям дозы уменьшают в зависимости от возраста; детям в возрасте до 6 мес препарат не назначают.

При применении пирроксана возможно усиление болей в области сердца у больных стенокардией.

Противопоказания: тяжелые формы атеросклероза, ИБС с приступами стенокардии, нарушения мозгового кровообращения, выраженная сердечная недостаточность.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: таблетки по 0,015 г (N. 50); 1% раствор в ампулах по 1 мл.

ХРАНЕНИЕ: список Б.

4. БУТИРОКСАН (Butiroxanum).

6-[1-Оксо-4-(3-фенилпирролидинил-1)-бутил]бензо-1,4-диоксана гидрохлорид:

Белый кристаллический порошок. Медленно и трудно растворим в воде и спирте.

